

SCREENING Déglutition post-intubation

- Si trouble de la **voix et/ou de la déglutition persistant 48H** après l'extubation
- Réalisé par personnel paramédical (infirmière / AS)
- Avis Orthophonie demandé en seconde intention avec **prescription médicale**



Fausse Routes : Signes d'alerte

- un patient qui tousse, qui râcle, qui bave, sensation de blocage
- une voix modifiée après la déglutition
- une régurgitation nasale

1. Le patient peut-il être vigilant :

Éveil suffisant assis ou semi-assis 90° ?

Oui → 2.

Non → Arrêt examen

2. Toux volontaire efficace ?

Oui → 3.

Non

3. Motricité linguale :

le patient peut-il tirer la langue **sans déviation** ?

Oui

Non

4. Déglutition salive

Oui, 3 fois sans Fausse Route

Si Fausse Route (Toux)
Ou plainte du patient :
« ça bloque »

Arrêt Examen
Avis Orthophoniste

DECT : 27973

5. ESSAI DEGLUTITION : patient assis 90°, ne pas allonger le patient pendant 45min après le repas paille et verre canard à proscrire



TEXTURE 1 :

Semi-liquide → yaourt brassé froid ou compote lisse sans grains (pas coing ni poire)

- Si aucune fausse route au bout de 3 cuillères à café → Essai Texture 2.

→ Passage en texture mixée sous surveillance.

- **Si fausse route,** essai avec **posture flexion antérieure tête**



- Si aucune fausse route observée lors de 3 essais (1 c à café par essai) → Texture 2 avec la même posture

- **Si fausse route** → Arrêt examen → Avis orthophoniste

TEXTURE 2 :

Liquide frais pétillant Perrier (± sirop menthe)

- Si aucune fausse route au bout de 3 c à café → essai 3 gorgées au verre

- Si aucune fausse route au verre → Liquide frais pétillant autorisé → essai eau plate à la cuillère à c.

- **Si fausse route** au verre → avis orthophoniste

- **Si fausse route** à la c à café → **essai avec posture flexion antérieure tête**

- Si aucune fausse route au bout de 3 cuillères, → 3 gorgées au verre avec la posture

- **Si fausse route** malgré posture → Arrêt examen → Avis orthophoniste

TEXTURE 3 :

Après validation texture mixée sur 48h

- mouliné normal
- Solide non fragmenté (Ø de miettes, riz, blé)
- Solide non collant (Ø pain de mie / madeleine)

- Si aucune fausse route → continuer mouliné non fragmenté pendant 48h puis texture normale. (1 repas entier sous surveillance)

- **Si fausse route** observée → **essai avec posture flexion antérieure tête**

- Si aucune fausse route, → continuer mouliné non fragmenté pendant 48h puis texture normale avec posture

- **Si fausse route** malgré posture → Arrêt examen → Avis orthophoniste